


## Cathéter central à insertion périphérique (PICC)

### DEFINITION

Ce cathéter est mis en place sous guidage échographique par un radiologue ou un médecin anesthésiste. Le dispositif est posé dans une veine périphérique, au dessus du pli du coude, l'extrémité distale du cathéter se trouvant dans la veine cave supérieure. Le PICC est pourvu, à son extrémité externe, d'une valve anti-reflux.

La pose du PICC constitue un geste médical, réalisé sous anesthésie locale.

Ce dispositif peut rester en place jusqu'à un an.



Valve      PICC      Cœur

### INDICATIONS

- Traitements par voie intra-veineuse supérieurs à une semaine, spécialement ceux utilisant des solutions hypertoniques, sclérosantes ou inflammatoires pour les petites veines : antibiotiques, nutrition parentérale, chimiothérapie anti cancéreuse, traitement de la douleur...
- Prélèvements sanguins

La pose d'un PICC peut être une solution temporaire avant la pose d'un site implantable.

### CONTRE INDICATIONS

- Irradiation du site d'implantation,
- Septicémie,
- Antécédents de thrombose ou d'intervention chirurgicale vasculaire,
- Allergie aux anesthésiants locaux.



# Cathéter central à insertion périphérique (PICC)

## **SURVEILLANCE DU PICC**

- Surveiller quotidiennement l'apparition de signes inflammatoires autour du point de ponction : rougeur, œdème, douleur, écoulement.
- L'apparition de frissons, d'une température supérieure à 38° en plus de signes inflammatoires, peuvent traduire une infection liée au PICC : prévenez rapidement votre médecin traitant et le Service de Radiologie dans lequel le dispositif a été posé.

## **ENTRETIEN DU CATHETER PAR UN(E) INFIRMIER(E)**

- Rinçage du cathéter, selon prescription médicale, au minimum une fois par semaine, par un(e) infirmier(e) à domicile, dans des conditions rigoureuses d'aseptie.
- Pansement systématique au moins une fois par semaine, au minimum, lors du rinçage ou dès qu'il est souillé ou décollé.
- par un(e) infirmier(e) à domicile, dans des conditions rigoureuses d'aseptie.
- Pansement systématique au moins une fois par semaine, au minimum, lors du rinçage ou dès qu'il est souillé ou décollé.

## **CONSEILS POUR LA PERSONNE PORTEUSE D'UN PICC**

- Préférer la douche au bain et bien protéger le pansement (semi-perméable) de l'eau.
- Éviter les mouvements de bras répétitifs, le port de lourdes charges.
- Privilégier les vêtements à larges manches.

## **RETRAIT DU PICC**

Le retrait du dispositif doit se faire dans des conditions d'asepsie rigoureuse, par un personnel qualifié et à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment. Une anesthésie locale n'est pas nécessaire.